52 42～46の手順で図ウのCの腫瘍と炎症を処置
（膿→P41、腫瘍→P37、炎症→P41）

53 術野を脳の下側に移動させ、42～46の手順で図ウのDの腫瘍と炎症を処置
（膿→P41、腫瘍→P37、炎症→P41）

54 術野を脳の右上に移動させ、42～46の手順で図ウのEの腫瘍と炎症を処置
（膿→P41、腫瘍→P37、炎症→P41）

55 バイタルを60付近まで回復
（バイタル回復→P33）

56 4、5の手順で図ウのての瘤を摘出して治療する
（動脈瘤→P43）

57 術野を脳の右下に移動させ、2の手順で図ウのに、ぬの動脈瘤を切り離す（動脈瘤→P43）

58 4、5の手順で図ウのに、ぬの瘤を摘出して治療する（動脈瘤→P43）

59 術野を左側に移動させ、4、5の手順で図ウのと、なの瘤を摘出して治療する（動脈瘤→P43）

60 脳の処置8・3人目　E・N 02:28:58　H 03:07:48
術野を脳の右側に移動させ、2の手順で図エのね、のの動脈瘤を切り離す（動脈瘤→P43）

61 術野を脳の左上に移動させ、2の手順で図エのは、ひの動脈瘤を切り離す（動脈瘤→P43）

62 バイタルを55付近まで回復
（バイタル回復→P33）

63 42～46の手順で図エのFの腫瘍と炎症を処置
（膿→P41、腫瘍→P37、炎症→P41）

64 術野を脳の中央付近に移動させ、42～46の手順で図エのGの腫瘍と炎症を処置
（膿→P41、腫瘍→P37、炎症→P41）

65 バイタルに注意し、術野を脳の右下に移動させ、42～46の手順で図エのHの腫瘍と炎症を処置
（膿→P41、腫瘍→P37、炎症→P41）

66 バイタルが20以上になるまで回復
（バイタル回復→P33）

67 4、5の手順で図エのね、のの瘤を摘出して治療する（動脈瘤→P43）

68 術野を脳の左上に移動させ、4、5の手順で図エのは、ひの瘤を摘出して治療する
（動脈瘤→P43）

The patient is saved !



56

脳の処置7では、動脈瘤をどれかひとつでも治療し終わると、脳の右下に動脈瘤がふたつ発生する。



65 －1

HARDではバイタル低下が激しいためこまめな回復が必要。処置に自信があっても30付近まで回復しよう。



65 －2


続けて脳の中央付近にある動脈瘤を処置するため、術野をあまり右端に移動させないで腫瘍を処置したい。



68

残り時間を確認し、スペシャルボーナスが獲得できる時間内であれば、治療するまえにバイタルを回復。

■ 図エ（動脈瘤、腫瘍の発生場所2）



上の図は脳の処置8で発生する病巣の場所を示したもの（ひらがなが動脈瘤、英文字が腫瘍）。記号はチャート表の番号と対応している。

SPECIAL BONUS

No	SPECIAL BONUS 獲得条件	EASY	NORMAL	HARD	獲得スコア
1	Miss 判定無し				400
2	○○○秒以上残して手術終了　※1	60	120	150	600
3	MAX CHAIN　○○○以上	80	100	120	600
4	動脈瘤を破裂させない　※2	—	—	—	400

※1……分表示では、EASYが1:00、NORMALが2:00、HARDが2:30　※2……巨大動脈瘤も含まれる


OPERATION RANK

ランク	スコア
C	14500 未満
B	14500 ～ 15999
A	16000 ～ 17099
S	17100 ～ 17699
XS	17700 以上



Episode 死にゆく夢 7-4

Data
［患　部］右肺
［バイタル］80（99）
［手術時間］05:00:00
［超執刀］使用可能



ギルスによって混乱してしまったアデルを治療する。GHPで研究されて生み出された「悪魔の子」と呼ばれる、新種のギルス・シゲーに立ち向かう。

The patient's Life is in your hands !

1 切開　E・N 04:58:01　H 04:57:28
腹部を消毒して切開（切開→P34）

2 右肺の処置1　E・N 04:46:23　H 04:44:06
膿×2を吸引し、裂傷×3を縫合
（膿→P41、裂傷→P33）

3 炎症（大）に消炎剤（青色の液体）を投与して沈静化させる（炎症→P41）

4 バイタルを99まで回復（バイタル回復→P33）

5 炎症（小）に消炎剤（青色の液体）を投与して沈静化させる（炎症→P41）

6 右肺の処置2　E・N 04:01:46　H 03:30:37
裂傷×2を縫合（裂傷→P33）

7 シゲーの位置を特定して露出させる
（シゲー→P53）

8 マイクに息を吹きかけて霧を吹き飛ばしつつ、バイタルを回復
（シゲー→P53、バイタル回復→P33）

9 シゲーが内出血を生み出した場合、内出血を切開し、血だまりを吸引して切開口を縫合
（内出血→P39）

10 ガス噴出口の血だまりを吸引し、追加トレイにある人工膜を患部に乗せて定着させる
（シゲー→P53）

11 発生している膿を吸引し、炎症に消炎剤（青色の液体）を投与して沈静化させる
（膿→P41、炎症→P41）


12 シゲー露出時に発生した切開口を治療しつつ、シゲー本体の動きを止める（シゲー→P53）

13 動きの止まったシゲーにダメージを与える
（シゲー→P53）

14 素早くシゲーの位置を特定して露出させる
（シゲー→P53）


15 8～10の手順でシゲーを露出させてガス噴出口を治療（シゲー→P53）

16 術野中央付近に発生した膿を吸引
（膿→P41）




3

炎症をすべて治療するとシゲーが出現するため、ひとつ残してバイタルを最大まで回復すること。




9

シゲーが臓器内に潜伏している時間が長いと内出血を生み出してくる。素早く露出させて阻止したい。




10

ガス噴出口が出現してから一定時間で血だまりが発生。できるだけ血だまりが発生するまえに治療しよう。




11

臓器全体にヒールゼリーを塗るように行なえば、飛び交うシゲーがみずからヒールゼリーに触れてくれる。



14 －1

シゲーにダメージを与えたら、素早くシゲーの潜伏した地点にエコーを当てて影を表示させよう。



14 －2

シゲーが潜伏したら素早く露出させること。このときに内出血を生み出されるのがいちばん厄介だ。



16

膿があるとほかの処置が行なえないため、中央付近の膿を吸引。端に発生した場合はあと回しでかまわない。

4 Operation Guide
CADUCEUS 2 OFFICIAL GUIDE BOOK DVD+